

# 意見書

園児名

病名 「 」

年 月 日から症状も回復し、集団生活に支障がない状態になったので登園許可と判断します。

年 月 日

医療機関名

醫師名

印

保護者様      お子さんが下記の感染症にかかり、登園されるときは、意見書の提出をお願いします。

## 意見書が望ましい感染症

| 感染症名                           | 感染しやすい期間                                         | 登園のめやす                                                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 麻疹(はしか)                        | 発症1日前から発しん出現後の4日前まで                              | 解熱後3日を経過してから                                               |
| インフルエンザ                        | 症状が有る期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い)             | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(幼児(乳幼児)にあつては、3日を経過するまで)       |
| 風しん                            | 発しん出現の前7日から後7日間くらい                               | 発しんが消失してから                                                 |
| 水痘(水ぼうそう)・带状疱疹                 | 発しん出現1～2日前から痂皮形成まで                               | すべての発しんが痂皮化してから                                            |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)                | 発症3日前から耳下腺腫脹後4日                                  | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで              |
| 結核                             |                                                  | 医師により感染の恐れがないと認めるまで                                        |
| 咽頭結膜熱(アデノウイルス感染症)              | 発熱、充血等症状が出現した数日間                                 | 主な症状が消え2日経過してから                                            |
| 流行性角結膜炎(はやり目)                  | 充血、目やに等症状が出現した数日間                                | 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから                                   |
| 百日咳                            | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで                       | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで                    |
| 腸管出血性大腸菌感染症(O157, O26, O111など) |                                                  | 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの |
| 急性出血性結膜炎                       | ウイルスが呼吸器から1～2週間、便から数週間～数か月排出される)                 | 医師により感染の恐れがないと認めるまで                                        |
| 髄膜炎菌性髄膜炎                       |                                                  | 医師により感染の恐れがないと認めるまで                                        |
| 溶連菌感染症                         | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間                            | 抗菌薬内服後24～48時間経過していること                                      |
| 感染性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)         | 症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること                                  |
| 手足口病                           | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間                             | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること                             |
| ヘルパンギーナ                        | 急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄しているので要注意)               | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること                             |
| RSウイルス感染症                      | 呼吸器症状のある間                                        | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと                                        |