

登園させても大丈夫？
こんなときは、登園を控えましょう

登園を控えたほうが望ましい場合

嘔吐編

- 24時間以内に2回以上の嘔吐がある
- 嘔吐に伴い、いつもより体温が高め
- 食欲がなく、水分もほしがらない
- 機嫌が悪く、元気がない
- 顔色が悪く、ぐったりしている

◎気になる症状が見られるときは、
医療機関を受診しましょう。



登園を控えたほうが望ましい場合

せき編

前日に発熱がなくても

- 夜間、しばしばせきのために起きる
- ゼーゼーしたり（喘鳴）呼吸困難がある
- 呼吸が速い
- 37.5℃以上の熱を伴っている
- 元気がなく、機嫌が悪い
- 食欲がなく、朝食・水分がとれない
- 少し動いただけで、せきがでる

◎気になる症状が見られるときは、
医療機関を受診しましょう。



登園を控えたほうが望ましい場合

下痢編

- 24時間以内に2回以上の水様便がある
- 食事や水分をとると、下痢がある
（1日に4回以上の下痢）
- 下痢に伴い、体温がいつもより高い
- 朝、排尿がない

◎気になる症状が見られるときは、
医療機関を受診しましょう。



登園を控えたほうが望ましい場合

発熱編

* 発熱期間と同日の回復期間が必要です。

- 朝から37.5℃を超える熱とともに
 - ・元気がなく機嫌が悪い
 - ・食欲がなく朝食・水分がとれていない
 - 24時間以内に解熱剤を使用している
 - 24時間以内に38℃以上の熱がでていた
- 1歳以下の乳児の場合は上記プラス…

- 平熱より1度以上高いとき
（38度以上あるとき）

◎気になる症状が見られるときは、
医療機関を受診しましょう。



登園を控えたほうが望ましい場合

発しん編

- 発熱とともに発しんがあるとき
- 今までになかった発しんがでて、感染症が疑われ、医師より登園を控えるよう指示されたとき
- 内炎のため食事や水分がとれないとき
- とびひ
 - ・顔等で、患部を覆えないとき
 - ・浸出液が多く、他児への感染のおそれがあるとき
 - ・かゆみが強く、手で患部をかいてしまうとき

◎気になる症状が見られるときは、
医療機関を受診しましょう。

